











こどもの予防接種のご案内

予防接種名		対象年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔など
ロタ	ロタリックス	生後6週～24週0日まで	初回接種は生後2か月～14週6日まで	2回	 →  27日以上あける
	ロタテック	生後6週～32週0日まで		3回	 →  →  27日以上あける
小児用肺炎球菌		生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で接種開始	4回	 初回 → 27日以上あける → 27日以上あける → 追加 60日以上あける、かつ1歳を過ぎてから
初回接種を生後7か月以降に受ける場合は医療機関にご相談ください。 2歳までに3回接種できなかった場合は、追加接種のみを受けてください。					
B型肝炎		1歳未満	生後2か月～9か月未満で3回接種	3回	 27日以上あける → 1回目の接種から139日(20週)以上あける
注) 母子感染症予防のため、出産後すぐに接種を開始した場合は健康保険の適用となり、定期接種の対象外となります。					
五種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)		生後2か月～7歳6か月未満	生後2か月で接種開始	4回	 初回 → 20日以上あける → 20日以上あける → 追加 1年以上あける
四種混合		ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ		接種時期、回数、間隔は五種混合と同じです。	
三種混合		ジフテリア、百日せき、破傷風		接種時期、回数、間隔は五種混合と同じです。	
ヒブ		生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で接種開始	4回	 初回 → 27日以上あける → 27日以上あける → 追加 7か月以上あける、かつ1歳を過ぎてから
初回接種を生後7か月以降に受ける場合は医療機関にご相談ください。 1歳までに3回接種できなかった場合は、1歳以降に追加接種のみを受けてください。その場合は最後の接種から27日以上の間隔をあけてください。					
BCG		1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回	

LINEセグメント配信をご利用ください

お子さんの月齢に合わせて
 ・予防接種 ・乳幼児健診
 ・市のサポート ・教室やイベント
 などをお知らせする便利な機能です。
 <登録方法>


- ①LINEで藤井寺市をお友だち登録
- ②受診設定→子育て→お子さんの生年月日を登録



詳しくはコチラから

他の予防接種との接種間隔

生ワクチン同士を接種する場合は、27日以上あけてください。
 生ワクチン以外のワクチンの組み合わせについては、
 日数の制限はありません。



予防接種名	対象年齢	標準的な接種時期	回数	接種間隔など	
水痘 (みずぼうそう)	1歳～3歳未満	1回目の接種は 1歳～1歳3か月まで	2回	① → ② 6か月以上あける 注)すでに水痘にかかったこと のある児は接種対象外です。	
麻しん風しん (MR)	<1期> 1歳～2歳未満 <2期> 年長児 (小学校就学前1年間)	初回接種は 1歳になったら すぐ	2回	① 1期 1歳～ 2歳前日まで → ② 2期 年長児 今年度の対象は R2.4.2～R3.4.1生まれ	
※対象期間内に接種を受けられなかった一部のかたを対象とした特例措置あり。詳しくは市ホームページを。					
日本 脳炎	1期	3歳～7歳6か月未満 ※医師に確認の上、 6か月から 接種できます。	初回 3歳 追加 4歳	2回 1回	① → ② → ③ 初回 6日以上あける 追加 6か月以上あける 標準的な接種間隔: 1～4週 標準的な接種間隔: おおむね1年
	2期	9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	1回	④ 9歳になる誕生日頃に個別通知をします。
	特例 措置	平成19年4月1日以前に生まれ、かつ20歳未満の人は、日本脳炎予防接種1期及び2期(全4回)の未接種分を無料で受けることができます。(接種期限:20歳の誕生日前日まで)			
二種混合 〔ジフテリア 破傷風〕	11歳～13歳未満	11歳	1回	① 11歳になる誕生日頃に個別通知をします。	
子宮頸がん予防 9価ワクチン (シルガード®9)	小学校6年生～ 高校1年生相当の 女子 (H22.4.2～ H27.4.1生まれ)	中学1年生	2回 または 3回	<ul style="list-style-type: none"> ●1回目を15歳になるまでに受ける場合 2回接種 初回 ① → 追加 ② 1回目から6か月後 ●1回目を15歳になってから受ける場合 3回接種 初回 ① → 追加 ③ 2か月後 → 1回目から6か月後 	

病気などにより接種を控える期間

病名など	接種できない期間	
	本人	兄弟などが 左記の病気にかかり 感染の可能性がある場合
麻しん 風しん おたふくかぜ 水ぼうそう 肺炎 など	感染後 4週間以内	兄弟などが感染後3週間以内 (おたふくかぜは4週間以内)
手足口病 ヘルパンギーナ 突発性発疹 腸管系ウイルス性疾患 インフルエンザ など	感染後 3週間以内	兄弟などが感染後2週間以内(突発性発疹は除く)
新型コロナ ウイルス感染症	感染者(有症状): 症状消失後2～4週間程度 陽性者(無症状): 診断後2週間程度 ※新型コロナワクチンは除く	

安全に予防接種を受けるために

- ①予防接種を受ける前に「母子健康手帳」の予防接種についてのページや、「予防接種とこどもの健康」の冊子をよくお読みください。
- ②予防接種当日は、接種を受けるお子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者がお子さんをお連れください。
- ③接種後約30分は医療機関でお子さんの様子を確認し、急な副反応が起こらないかご注意ください。

ご確認ください

以下の方は、市ホームページで接種方法などをご確認ください。

- ・心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などで治療を受けている方
- ・長期療養を必要とする疾病等により、定期接種を受けられなかった方
- ・長期の里帰りなどを予定されている方

市ホームページ
子どもの予防接種



ご不明な点がございましたら、健康・医療連携課までお問合せください。